Livelli di Manganese e Cadmio e correlazione con caratteristiche individuali e abitudini alimentari: Uno studio di popolazione nel Nord Italia.

Filippini T¹, Malagoli C², Storani S², Ferrari A², Cavazzuti L³, De Girolamo G³, Michalke B⁴, Vinceti M²

¹Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Università di Modena e Reggio Emilia, Modena. ²CREAGEN – Centro di Ricerca in Epidemiologia Ambientale, Genetica e Nutrizionale, Università di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia. ³Unità Sanitaria Locale di Modena, Modena. ⁴Research Unit Analytical BioGeoChemistry, Helmholtz Zentrum München – German Research Center for Environmental Health GmbH, Neuherberg

Introduzione

Il Cadmio (Cd) è un metallo pesante con un ampio spettro di rischi per la salute umana. Le principali fonti di contaminazione di origine antropica sono associate ad attività minerarie, industrie metallurgiche, acque reflue e fertilizzanti prodotti con fosfati di origine minerale. L'esposizione non occupazionale al cadmio avviene principalmente con la dieta, il fumo di sigaretta e l'inquinamento atmosferico da gas di scarico, emissioni industriali e di inceneritori di rifiuti. Il cadmio è stato classificato come cancerogeno per l'uomo ed è associato a tumore di polmone, prostata, mammella e rene.

Il Manganese (Mn) è un elemento essenziale che presenta un effetto neurotossico a elevate concentrazioni. L'esposizione avviene tramite la dieta, l'acqua potabile e in ambito occupazionale nei lavoratori di fonderie e di industrie di batterie.

Obiettivi e Metodi

Scopo di questo studio è valutare i livelli sierici di questi due elementi in un campione rappresentativo della popolazione del comune di Modena e di esaminare le caratteristiche individuali e le abitudini personali che ne influenzano le concentrazioni. Le determinazioni analitiche di Cd e Mn sono state condotte tramite spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS). Oltre al prelievo ematico, ai soggetti abbiamo chiesto di compilare un questionario per la valutazione di fattori quali età, indice di massa corporea (BMI), abitudine tabagica e uso di supplementi dietetici, questi ultimi largamente assunti, sebbene l'efficacia per la prevenzione di malattie cronico-degenerative e la sicurezza sia ancora incerta e controversa.

Bibliografia

- Jarup L, Akesson A. *Current status of cadmium as an environmental health problem*. Toxicol Appl Pharmacol. 2009;238:201-208.
- Bocca B, Madeddu R, Asara Y, Tolu P, Marchal JA, Forte G. *Assessment of reference ranges for blood Cu, Mn, Se and Zn in a selected Italian population*. J Trace Elem Med Biol. 2011;25:19-26.
- Madeddu R, Solinas G, Forte G, Bocca B, Asara Y, Tolu P, Delogu LG, Muresu E, Montella A, Castiglia P. *Diet and nutrients are contributing factors that influence blood cadmium levels*. Nutr Res. 2011;31:691-697.
- European Food Safety Authority. *Cadmium dietary exposure in the European population*. EFSA journal. 2012;10:2551.
- Iarc Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. *Arsenic, metals, fibres, and dusts*. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 2012;100:11-465.
- Guallar E, Stranges S, Mulrow C, Appel LJ, Miller ER, 3rd. *Enough is enough: Stop wasting money on vitamin and mineral supplements*. Ann Intern Med. 2013;159:850-851.
- Michalke B, Fernsebner K. *New insights into manganese toxicity and speciation*. J Trace Elem Med Biol. 2014;28:106-116.

Risultati

In totale sono stati valutati 50 soggetti di entrambi e sessi (25 uomini e 25 donne) dai 35 a 71 anni (età media 51.8 deviazione standard 10.4). I livelli mediani (range) di Cd e Mn sono risultati pari a 40.85 ng/l (17.4-146.9) e 2.28 mcg/l (0.72-8.18)(Tabella 1). Usando un modello di regressione lineare bivariato i livelli sierici di Cd correlano negativamente con età (Beta=-0.56, IC 95% -1.21-0.10; $P=0.095$), uso di supplementi (-9.64, -26.78-7.49; $P=0.264$) e positivamente con BMI (1.10, -0.35-2.55; $P=0.133$) e fumo (4.60, -4.38-13.59; $P=0.308$). Per il Mn, la correlazione è positiva per età (0.04, 0.01-0.08; $P=0.041$), nulla per BMI (0.01, -0.08-0.09; $P=0.870$) e debolmente negativa per fumo (-0.16, -0.68-0.37; $P=0.550$) e assunzione di supplementi (-0.55, -1.58-0.48; $P=0.290$). Usando un modello multivariato le correlazioni precedentemente evidenziate risultano generalmente confermate (Tabella 2).

	Cadmio (ng/L)			Manganese (µg/L)		
	n	50 th	IQR	50 th	IQR	P ^a
Totale	50	40.9	(30.1 - 53.5)	2.28	(1.81 - 3.07)	
<50 anni	23	43.0	(36.1 - 58.7)	2.29	(1.70 - 2.94)	0.777
≥50 anni	27	34.7	(27.5 - 48.2)	2.26	(1.97 - 3.83)	
<25 BMI	23	37.7	(29.4 - 48.2)	2.17	(1.60 - 3.06)	0.777
≥25 BMI	27	43.5	(30.1 - 63.5)	2.29	(1.98 - 3.97)	
Non-fumatori	26	35.6	(29.1 - 43.5)	2.28	(2.05 - 3.18)	0.915
Ex-fumatori	15	45.8	(29.3 - 57.5)	2.39	(1.71 - 3.06)	
Fumatori	9	54.8	(42.4 - 58.7)	2.10	(1.78 - 2.63)	
No Suppl.	40	42.7	(32.0 - 54.6)	2.28	(1.87 - 3.12)	0.995
Si Suppl.	10	32.9	(29.1 - 47.1)	2.30	(1.78 - 2.94)	

^aP value per test di uguaglianza delle mediane

Tabella 1. Distribuzione dei livelli sierici di Cd e Mn.

Prof. Marco Vinceti,
Centro di Ricerca in Epidemiologia Ambientale,
Genetica e Nutrizionale (CREAGEN),
Università di Modena e Reggio Emilia -
E-mail: marco.vinceti@unimore.it

	Grezzo			Aggiustato ^a		
	β	IC 95%	P	β	IC 95%	P
Cadmio						
Età	-0.56	(-1.21 - 0.10)	0.095	-0.50	(-1.16 - 0.17)	0.141
BMI	1.10	(-0.35 - 2.55)	0.133	1.07	(-0.36 - 2.51)	0.138
Fumo	4.60	(-4.38 - 13.59)	0.308	4.27	(-4.50 - 13.04)	0.332
Supplementi	-9.64	(-26.78 - 7.49)	0.264	-5.90	(-23.03 - 11.23)	0.492
Manganese						
Età	0.04	(0.01 - 0.08)	0.041	0.04	(0.00 - 0.08)	0.031
BMI	0.01	(-0.08 - 0.09)	0.870	0.00	(-0.08 - 0.08)	0.998
Fumo	-0.16	(-0.68 - 0.37)	0.550	-0.15	(-0.66 - 0.36)	0.548
Supplementi	-0.55	(-1.58 - 0.48)	0.290	-0.72	(-1.75 - 0.30)	0.163

^aAggiustato per età, BMI, fumo e uso di supplementi

Tabella 2. Coefficienti di regressione lineare uni e multivariata

Conclusioni

In conclusione, nonostante la limitata numerosità campionaria, per il Cd le analisi confermano la relazione diretta con fumo e BMI, infatti il cibo rappresenta dopo il fumo la principale fonte non occupazionale di Cd, mentre l'uso di integratori ne diminuisce parzialmente i livelli, probabilmente per la competizione nell'assorbimento dovuta soprattutto a Zinco e Rame. Per il Mn emerge una relazione debole ma diretta con l'età, mentre fumo e BMI non sembrano correlati. Infine lo studio sembra evidenziare come l'uso di supplementi non determini un aumento dei livelli di Mn, seppure le quantità assunte variano da 0.5 a 2 mg/die secondo i dati riportati in etichetta, in contrasto quindi con lo scopo di colmare eventuali carenze nutrizionali per cui vengono utilizzati.

efficacia campione fumo cronicità dieta sicurezza metalli prelievo supplementi parole chiave regressione studio ricerca alimentare

BMI fumo malattia sicurezza cadmio manganese

caratteristiche cibo effetto questionario neurotossicità elementi in traccia esposizione analisi

essenziale popolazione abitudini et soggetti tossico modello correlazione